

Arzneimittelvereinbarung 2012:

Zielvereinbarung Nr. 8 und 8a – Opiode der WHO-Stufe III

Leitsubstanz / Handlungsempfehlung	Beispielhafte Möglichkeit zur Zielerreichung
BtM-rezeptpflichtige Analgetika Bevorzugte Therapie mit generischem retardiertem Morphin gemäß WHO- Empfehlung	Anteil generisches Morphin (DDD) an oraler Therapie > 97%
TTS-Opiode in der WHO-Stufe III: Wechsel möglichst auf orales Morphin	Anteil transdermaler therapeutischer Systeme (TTS) an den Verordnungen der WHO-Stufe III < 40%

1. Welche Wirkstoffe fallen unter diese Gruppe?

Morphin, Buprenorphin, Fentanyl, Oxycodon, Hydromorphon.

2. Warum wurden diese Leitsubstanzen ausgewählt?

Entsprechend international anerkannter Empfehlungen gilt orales retardiertes Morphin als Mittel der ersten Wahl bei schweren Schmerzen (WHO-Stufe III). Erst bei unzureichender analgetischer Wirkung oder intolerablen Nebenwirkungen sollte ein Wechsel auf ein anderes Präparat der Wirkstoffgruppe erwogen werden. Eine grundsätzliche Überlegenheit von Oxycodon und Hydromorphon im Vergleich zu Morphin – auch im Vergleich zu den bekannten Nebenwirkungen – ist bisher nicht durch randomisierte Untersuchungen belegt.

Cave – Teure Originalpräparate!

Verschiedene Originalpräparate, deren therapeutischer Stellenwert kritisch diskutiert wird, verursachen hohe Verordnungsvolumina. Auch der Arzneimittelbrief aus September 2011 bewertet die Fixkombination von Oxycodon und Naloxon (Targin[®]) und das als Analogpräparat eingestufte Palexia retard[®] kritisch in Bezug auf den therapeutischen Stellenwert. Beachten Sie auch, dass Palexia retard[®] nicht unter die automatische Quantifizierung im Rahmen der standardisierten Praxisbesonderheit gemäß der Prüfvereinbarung für Westfalen-Lippe fällt.

Transdermale Systeme sind Mittel der Reserve

Der Einsatz von transdermalen Opioiden sollte beschränkt werden auf Situationen, in denen die oralen Applikationsformen kontraindiziert oder nicht anwendbar sind (z. B. bei Schluckstörungen).

3. Weitere Informationen für Sie

[Therapieempfehlung Tumorschmerz 2007](#)

[Wirkstoff AKTUELL 2007 – Fentanyl](#)

[Oxycodon/Naloxon \(Targin[®]\) – teure Analgetikakombination ohne Zusatznutzen](#)