

# Nationale Teststrategie SARS-CoV-2

Stand 14.10.2020

Für eine Aufzählung der spezifischen Einrichtungen und Personengruppen ist die Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 verbindlich.

## Empfehlung Test-Typ

PCR-Test    Antigen-test<sup>2</sup>    Frequenz    Kosten-Regelung    Priorisierung

### Symptomatische Personen<sup>1</sup>

Grundsätzlich gilt:

1) Erweiterte Basishygiene

2) Symptom-Monitoring

3) Gemäß Vorschriften Bund/Länder: Abstand halten, Hygieneregeln einhalten, Alltagsmaske tragen, Lüften (AHA+L)

### Asymptomatische Personen

Allgemeinbevölkerung (exponiert)

**Kontaktpersonen:** Personen mit **Kontakt zu bestätigtem COVID-19 Fall** (z.B. gleicher Haushalt, 15-minütiger Kontakt, sowie über Corona-Warn-App)  
**Bei Ausbruch:** Personen in Einrichtungen oder Unternehmen nach §§ 23 Abs. 3 und 36 Abs. 1 IfSG, z.B. Arztpraxen, Kitas, Schulen, Asylbewerberheime

Krankenhäuser/  
Pflege/  
Einrichtungen für

**(Wieder-)Aufnahme** sowie vor ambulanten Operationen oder vor ambulanter Dialyse

Patienten/  
Bewohner/  
Betreute

bei Ausbruch

ohne COVID-19 Fall

-Menschen mit Behinderungen

Personal

bei Ausbruch

ohne COVID-19 Fall

-Ambulante Operationen

-Ambulante Dialyse

Besucher

vor Besuch der Einrichtung

(Zahn-)Arztpraxen, weitere Praxen<sup>8</sup>

Personal

bei Ausbruch

ohne COVID-19 Fall

Einreisende aus Risikogebiet (gemäß Musterquarantäneverordnung/Testpflichtverordnung)

PCR-Test	Antigen-test <sup>2</sup>	Frequenz	Kosten-Regelung	Priorisierung
■	■ <sup>3</sup>	●	K	1
■	■ <sup>3</sup>	●	RVO, K	2
■	■ <sup>4,5</sup>	●	RVO	3
■	■ <sup>3</sup>	●	RVO, K (KHG)	3
■	■ <sup>4,5</sup>	●	RVO	2
■	■ <sup>6</sup>	↻	RVO	5
■	■ <sup>4,5</sup>	●	RVO	2
■	■ <sup>6</sup>	↻	RVO	4
■	■ <sup>7</sup>	↻	RVO	5
■	■ <sup>4,5</sup>	●	RVO	2
■	■ <sup>5,6</sup>	↻	RVO	4
■	■	●	RVO	5

■ Empfohlen

■ Möglich

■ Möglich bei begrenzter PCR-Kapazität

● Akut (Wiederholung bis zu einmal pro Person)

↻ Regelmäßig, abhängig von Testkonzept der Einrichtung/Unternehmen

1) Differenzialdiagnostische Aspekte berücksichtigen (z.B. Influenza)

2) Bei positivem Antigen-Testergebnis Bestätigung durch PCR

3) Falls schnelles Resultat notwendig

4) Ggf. zur Kohorten-Isolierung

5) Z.B. auch labor-basierte Antigen-Test zur Entlastung von PCR-Kapazitäten

6) Empfehlung für Reihentestungen: Abstimmung mit der lokalen Gesundheitsbehörde, 7-Tage-Inzidenz >50/100.000, Einhaltung der Hygienemaßnahmen

7) Empfohlen bei 7-Tage-Inzidenz >50/100.000, Einhaltung der Hygienemaßnahmen

8) Praxen anderer humanmedizinischer Heilberufe nach §23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 9 IfSG

K = Krankenbehandlung

KHG = Krankenhausfinanzierungsgesetz

RVO = Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2