



PETITS ET DANGEREUX AUCUNE CHANCE POUR LES VIRUS ET LES BACTÉRIES!

INFORMATION AUX PATIENTS

L'ESSENTIEL EN UN CLIN D'ŒIL

- Afin que la protection par le vaccin se maintienne, il est nécessaire de se soumettre aux injections de rappel. Cette obligation dure pendant toute la vie.
- La vaccination ne protège pas uniquement les personnes vaccinées. Lorsque la densité des personnes immunisées atteint un certain seuil, certains agents pathogènes peuvent être éradiqués, par exemple le virus de la rougeole.
- Les vaccins confectionnés de nos jours figurent parmi les médicaments les plus sûrs. Les effets indésirables extrêmes et les altérations durables de la santé sont extrêmement rares. Il se peut qu'un rougissement ou une petite tuméfaction apparaisse sur le point d'injection ou que l'on constate une poussée de fièvre. C'est le signe que l'organisme mobilise ses anticorps.
- Les caisses publiques de santé prennent en charge tous les frais pour les vaccinations mentionnées dans la Directive sur l'immunisation préventive, sur la base des Recommandations de la Commission permanente des vaccinations (STIKO) de l'Institut Robert Koch.

N'OUBLIEZ PAS: PREMIÈRE VACCINATION ET TOUS LES RAPPELS.

La vaccination est l'une des techniques de prévention les plus simples et les plus efficaces contre les maladies infectieuses. Veuillez demander conseil à votre médecin sur votre bilan des vaccinations. Il vous dira quelles sont celles qui doivent être complétées et quels sont les rappels et mises à jour nécessaires. Il vous dira quelles sont celles qui doivent être complétées et quels sont les rappels et mises à jour nécessaires.

LES ASSOCIATIONS DE MÉDECINS CONVENTIONNÉS (KV) ET LA FÉDÉRATION NATIONALE DES MÉDICINS CONVENTIONNÉS (KBV)

Les soins ambulatoires sont dispensés en Allemagne par 165.000 médecins et psychothérapeutes. Ils sont encadrés par les associations de médecins conventionnés (KV) afin d'assurer une couverture sanitaire complète:

- Les associations concluent des contrats de soins ambulatoires avec les caisses publiques de santé pour tous les médecins et psychothérapeutes entretenant un cabinet de consultations et de soins. Les patients peuvent s'adresser à n'importe quel médecin et psychothérapeute pour leurs vaccinations, quelle que soit leur caisse maladie.
- Les médecins et psychothérapeutes affiliés délivrent les soins ambulatoires 24 heures sur 24.
- Les associations vérifient la qualification des médecins et psychothérapeutes sous contrat, contrôlent l'équipement des cabinets médicaux et s'assurent de la qualité des consultations médicales.

La Fédération nationale des médecins conventionnés (KBV) regroupe les dix-sept associations de médecins conventionnés (KV) existant en Allemagne.

Vous trouverez toutes les autres informations utiles sur ce sujet à l'adresse Internet: www.kbv.de

..... Cachet du cabinet médical

POURQUOI VACCINER?

Il est possible de s'immuniser contre ces maladies
(conformément aux Recommandations courantes de la Commission permanente des vaccinations [STIKO] de l'Institut Robert Koch)

VACCINATIONS

	Age recommandé pour la vaccination										Ma prochaine vaccination
	6 se-maines	2 mois	3 mois	4 mois	11 à 14 mois	15 à 23 mois	5 et 6 ans	9 à 14 ans	15 à 17 ans	à partir de 18	
Diphtérie		1.	2.	3.	4.		A	A		A**	
Tétanos		1.	2.	3.	4.		A	A		A**	
Coqueluche		1.	2.	3.	4.		A	A		A***	
Haemophilus influenzae de type b (Hib)		1.	2.*	3.	4.						
Poliomyélite		1.	2.*	3.	4.		A				
Hépatite B		1.	2.*	3.	4.						
Rougeole											
Oreillons					1.	2.			S#		
Rubéole											
Varicelle					1.	2.					
Grippe virale (influenza)										S**	
Pneumocoques +		1.	2.	3.						S***	
Méningocoques						1.					
Humane Papillomavirus (HPV) ***							SM				
Rotavirus		1.	2.	3.*							

Remarque: Les vaccinations mentionnées ici sont les Recommandations courantes de la Commission permanente des vaccinations (STIKO) de l'Institut Robert Koch. Il existe plusieurs autres vaccinations pour les femmes pendant la période de procréation, les catégories de personnes à risque et certaines catégories professionnelles, les dépistements dans certaines contrées, etc. Il ne nous est pas possible de mentionner ici toutes les indications. Veuillez consulter votre médecin.

Pour des raisons de sécurité, la Commission permanente des vaccinations STIKO recommande de rattraper les vaccinations qui ont été oubliées jusqu'à l'âge de 18 ans révolus.

A Rappel

S Immunisation courante

SM Immunisation courante pour les jeunes filles.

Vaccination contre la rougeole pour tous les adultes très après 1970 n'ayant jamais été vaccinés ou ayant été vaccinés une fois pendant l'enfance ou dont le statut immunitaire n'est pas clair.

+ Les prématurés reçoivent une dose de vaccin supplémentaire à l'âge de 3 mois.

* Pour certains vaccins, cette périodicité peut être supprimée.

** Chaque année avec le vaccin actuel.

*** Mise à jour de la vaccination tous les cinq ans (uniquement pour certaines indications).

** Mise à jour de la vaccination tous les dix ans.

** Immunisation de base avec 2 ou 3 doses en fonction de l'âge et du vaccin.

*** une seule fois à l'âge adulte.