

Anlage 5

zum Vertrag zur besonderen ambulanten augenchirurgischen Versorgung

Dokumentationsbögen für Operationen sowie Verlaufskontrollen

- **AMD**

Im Rahmen der Umsetzung der medizinischen Erkenntnisse zur Anti-VEGF-Therapie bei der AMD haben sich mehrere individualisierte Behandlungsstrategien etabliert, mit denen sich funktionelle Ergebnisse erreichen lassen wie sie in den Zulassungsstudien mit festen Injektionsstrategien erreicht wurden. Diese können als Grundlage für die Behandlung der Patienten benutzt werden, müssen aber jeweils konsequent und spezifisch umgesetzt und dokumentiert werden.

Die Entscheidung über die verwendete Behandlungsstrategie liegt beim behandelnden Augenarzt und muss mit Behandlungsbeginn festgelegt werden. Ein Wechsel zwischen den unterschiedlichen Behandlungsstrategien ist nicht sinnvoll und muss im Ausnahmefall ausführlich dokumentiert und begründet werden .

Folgende Behandlungsstrategien können angewendet werden:

Anlage 5 a:

Schema gemäß IVAN-Studie: initial 3 Injektionen mit anschließender monatlicher Kontrolle und erneuten 3 Injektionen bei SD-OCT orientierter Läsionsaktivität; Beendigung der Therapie bei Stabilität der CNV über 6 Monate

Anlage 5 b:

Schema gemäß CATT-Studie: initial 3 Injektionen mit anschließender monatlicher Kontrolle und jeweils erneuter Einzel-Injektion bei SD-OCT orientierter Läsionsaktivität; Beendigung der Therapie Stabilität der CNV über 6 Monate

Anlage 5 c:

Schema gemäß „Treat and Extend“-Schema: initial 3 Injektionen mit anschließender monatlicher Kontrolle; bei persistierender SD-OCT orientierter Läsionsaktivität weitere Injektion mit monatlicher Kontrolle; bei SD-OCT orientierter Läsionsstabilisierung erneute Injektion und Verlängerung des Kontrollintervalls um 2 Wochen bis zum maximalen Kontrollintervall von 3 Monaten, danach Beendigung der Therapie; bei erneuter SD-OCT orientierter Läsionsaktivität Verkürzung des Kontrollintervalls um 2 Wochen.

- **DMÖ – Anlage 5 d**
- **RVV – Anlage 5 e**
- **CNV bei pathologischer Myopie – Anlage 5 f**
- **Akute posteriore Uveitis - Anlage 5 g**