

Wirkstoff / Fertigarzneimittel (Beschluss in Kraft getreten am)	Zugelassenes Anwendungsgebiet	Indikation / Patientengruppe	Zweckmäßige Vergleichstherapie	G-BA-Bewertung	Preisverhandlung/ Praxisbesonderheit (Hersteller & GKV-Spitzenverband)
Baloxavir marboxil – Xofluza® (05.08.2021) (Influenza, ≥ 12 Jahre)	Behandlung der Influenza: Xofluza® wird angewendet bei Patienten ab 12 Jahren zur Behandlung einer unkomplizierten Influenza. Postexpositions-Prophylaxe der Influenza; Xofluza® wird zur Postexpositions-Prophylaxe einer Influenza bei Personen ab 12 Jahren angewendet. Xofluza® sollte in Übereinstimmung mit offiziellen Empfehlungen angewendet werden. <u>Anwendungsgebiet des Beschlusses:</u> Xofluza® wird angewendet bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren zur Behandlung einer unkomplizierten Influenza.	a) Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren mit Influenza ohne Risiko für Influenza-bedingte Komplikationen	a) eine symptomatische Therapie (Antipyretika, Antiphlogistika, Analgetika)	Zusatznutzen nicht belegt	
		b) Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren mit Influenza, wenn ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf besteht	b) eine antivirale Therapie (Oseltamivir oder Zanamivir)	Zusatznutzen nicht belegt	
Baloxavir marboxil – Xofluza® (05.08.2021) (Influenza, Postexpositions-Prophylaxe, ≥ 12 Jahre)	Behandlung der Influenza: Xofluza® wird angewendet bei Patienten ab 12 Jahren zur Behandlung einer unkomplizierten Influenza. Postexpositions-Prophylaxe der Influenza; Xofluza® wird zur	a) Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren mit Influenzaexposition ohne Risiko für Influenza-bedingte Komplikationen	a) beobachtendes Abwarten	Hinweis auf einen beträchtlichen Zusatznutzen	

	<p>Postexpositions-Prophylaxe einer Influenza bei Personen ab 12 Jahren angewendet. Xofluza sollte in Übereinstimmung mit offiziellen Empfehlungen angewendet werden.</p> <p><u>Anwendungsgebiet des Beschlusses:</u> Xofluza® wird zur Postexpositions-Prophylaxe einer Influenza bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren angewendet.</p>	<p>b) Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren mit Influenzaexposition mit Risiko für Influenza-bedingte Komplikationen</p>	<p>b) eine antivirale Therapie (Oseltamivir oder Zanamivir)</p>	<p>Zusatznutzen nicht belegt</p>	
--	--	--	---	----------------------------------	--

Anforderungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung:

Die Vorgaben der Fachinformation sind zu berücksichtigen.

Hinweis

Haben Sie vor einer Verordnung Interesse oder Bedarf an Detail- und Hintergrundinformationen zu dem Verfahren oder dem Beschluss, so finden Sie diese über den folgenden Link beim G-BA.

G-BA: Frühe Nutzenbewertung <http://www.g-ba.de/informationen/nutzenbewertung/>

Zu Indikationen, Patientengruppen und Zielpopulationen werden nähere Angaben gemacht. Therapiekosten werden verglichen und detailliert dargestellt. Anforderungen für eine qualitätsgesicherte Anwendung könnten z. B. Beschränkungen bei der Verordnung auf Fachärzte oder bestimmte definierte Patientengruppen vorsehen.