

Wirkstoff / Fertigarzneimittel (Beschluss in Kraft getreten am)	Zugelassenes Anwendungsgebiet	Indikation / Patientengruppe	Zweckmäßige Vergleichstherapie	G-BA-Bewertung	Preisverhandlung/ Praxisbesonderheit (Hersteller & GKV-Spitzenverband)
Lixisenatid – Lyxumia® (05.09.2013)	Lyxumia® wird angewendet bei Erwachsenen zur Behandlung des Typ-2-Diabetes mellitus in Kombination mit oralen blutzuckersenkenden Arzneimitteln und/oder Basalinsulin, wenn diese zusammen mit Diät und Bewegung den Blutzucker nicht ausreichend senken.	a) Add-on Kombinationstherapie mit Metformin.	a) Sulfonylharnstoff (Glibenclamid oder Glimepirid) + Metformin	a) Zusatznutzen ist nicht belegt.	Erstattungsbetrag festgesetzt. Seit 01.04.2014 in Deutschland außer Vertrieb
		b) Add-on Zweifach-Kombination mit einem oralen Antidiabetikum (außer Metformin).	b) Metformin + Sulfonylharnstoff (Glibenclamid oder Glimepirid) (Hinweis: Wenn Metformin gemäß Fachinformation nicht geeignet ist, ist Humaninsulin als Therapieoption einzusetzen)	b) Zusatznutzen ist nicht belegt.	
		c) Add-on Dreifach-Kombination mit oralen Antidiabetika.	c) Metformin + Humaninsulin (Hinweis: ggf. Therapie nur mit Humaninsulin, wenn Metformin nicht ausreichend wirksam ist)	c) Zusatznutzen gilt als nicht belegt.	
		d) Add-on Kombination mit einem Basalinsulin mit oder ohne Metformin.	d) Metformin + Humaninsulin (Hinweis: ggf. Therapie nur mit Humaninsulin, wenn Metformin gemäß Fachinformation unverträglich oder nicht ausreichend wirksam ist)	d) Zusatznutzen ist nicht belegt.	