

Wirkstoff / Fertigarzneimittel (Beschluss in Kraft getreten am)	Zugelassenes Anwendungsgebiet	Indikation / Patientengruppe	Zweckmäßige Vergleichstherapie	G-BA-Bewertung	Preisverhandlung/ Praxisbesonderheit <small>(Hersteller & GKV-Spitzenverband)</small>
Mikrobielle Collagenase aus Clostridium histolyticum – Xiapex® (19.04.2012)	Xiapex® ist indiziert zur Behandlung einer Dupuytren'schen Kontraktur bei Patienten mit einem tastbaren Strang.	Dupuytren'sche Kontraktur, Stadium N nach Tubiana (tastbare Knoten oder Stränge, keine Kontraktur)	Keine Therapie	Zusatznutzen nicht belegt	Hersteller hat Vertrieb eingestellt (16.05.2012)
		Dupuytren'sche Kontraktur, Stadien N/I, I und II nach Tubiana (Kontraktur $\leq 90^\circ$)	Perkutane Nadelfasziotomie (PNF)	Zusatznutzen nicht belegt	
		Dupuytren'sche Kontraktur, Stadien III und IV nach Tubiana (Kontraktur $> 90^\circ$)	Partielle Fasziektomie	Zusatznutzen nicht belegt	
		Dupuytren'sche Kontraktur, Stadien III und IV nach Tubiana (Kontraktur $> 90^\circ$) mit Kontraindikationen für partielle Fasziektomie	Perkutane Nadelfasziotomie	Zusatznutzen nicht belegt	