

Information zu Verordnungen in der GKV

Datum: März 2015
Aktualisierung: Juni 2018

HPV-Impfung für Mädchen von 9 bis 14 Jahren jetzt GKV-Leistung

Die Änderung der Schutzimpfungs-Richtlinie sieht eine Impfung gegen humane Papillomviren (HPV) für Mädchen der Altersgruppe 9 bis 14 Jahren vor (bisher 12-17 Jahre).

Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ein Zwei-Dosis-Schema für die Impfstoffe Gardasil 9® und Cervarix® für Kinder von 9 bis 14 Jahren gilt, für den Impfstoff Gardasil® nur für Kinder von 9 bis einschließlich 13 Jahren. Das Zwei-Dosen-Impfschema kann eine höhere Impfcompliance bei jungen Mädchen sowie eine höhere Durchimpfungsrate bewirken. Da ältere Mädchen (ab 14 bzw. 13 Jahren) weiterhin nach dem Drei-Dosis-Schema geimpft werden müssen, steigen die Impfstoffkosten. Nachholimpfungen können bis 18 Jahre durchgeführt werden.

Für Mädchen im Alter von 9 bis 14 Jahren	Im Alter von 9 bis 13 bzw. 9 bis 14 Jahren ist ein Zwei-Dosen-Impfschema von 6 Monaten zugelassen. Bei Nachholimpfungen oder der Vervollständigung einer Impfschritte im Alter von > 13 Jahren bzw. > 14 Jahren oder bei einem Impfabstand von < 6 Monaten zwischen der 1. und 2. Dosis ist eine 3. Impfstoffdosis erforderlich.
--	--

Impfstoff	HPV-Virus-Typ	Alter zum Zeitpunkt der ersten Dosis	Impfschema	Dokumentationsziffern
Gardasil9®	6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 52, 58 Prävention maligner Läsionen und Karzinome, die die Zervix, Vulva, Vagina und den Anus betreffen, Genitalwarzen (Condylomata acuminata)	9 bis einschließlich 14 Jahre	2-Dosen-Schema (je 0,5ml) in Monat 0 und 5-13	1. Dosis: 89110A 2. Dosis: 89110B
		15 Jahre und älter	3-Dosen-Schema (je 0,5ml) in Monat 0, 2 und 6	1. Dosis: 89110A 2. Dosis: 89110A 3. Dosis: 89110B
Cervarix®	16, 18 Prävention von prä-malignen genitalen Läsionen der Zervix, Vulva und Vagina und von Zervixkarzinomen	9 bis einschließlich 14 Jahre	Möglich: 2 Dosen (je 0,5 ml) im Monat 0 und 6	1. Dosis: 89110A 2. Dosis: 89110B
		15 Jahre und älter	3 Dosen (je 0,5 ml) im Monat 0, 1 und 6	1. Dosis: 89110A 2. Dosis: 89110A 3. Dosis: 89110B
Gardasil®	16, 18 Prävention von prä-malignen genitalen Läsionen der Zervix, Vulva und Vagina und von Zervixkarzinomen	9 bis einschließlich 13 Jahre	Möglich: 2 Dosen (je 0,5 ml) im Monat 0 und 6	1. Dosis: 89110A 2. Dosis: 89110B
		14 Jahre und älter	3 Dosen (je 0,5 ml) im Monat 0, 2 und 6	1. Dosis: 89110A 2. Dosis: 89110A 3. Dosis: 89110B